

5 予防接種の種類と接種時期

種類	接種対象時期 【標準的な接種時期】		接種回数
インフルエンザ 菌b型 (Hib)	初回	生後2か月から60か月末満 【初回接種開始は、生後2か月から7か月末満】 【追加接種は、初回接種終了後7か月から13か月までの間隔をおく】	『接種開始が生後2か月から7か月末満』 3回 (27日以上56日までの間隔で3回接種) 『接種開始が生後7か月から12か月末満』 2回 (27日以上56日までの間隔で2回接種)
	追加		『接種開始が生後2か月から7か月末満』 1回 (3回目の接種から7か月以上13か月までの間隔で1回接種) 『接種開始が生後7か月から12か月末満』 1回 (2回目の接種から7か月以上13か月までの間隔で1回接種)
			『接種開始が1歳から5歳未満』 1回
小児用肺炎球菌	初回	生後2か月から60か月末満 【初回接種開始は、生後2か月から7か月末満】 【追加接種は、初回接種終了後60日以上の間隔をおいて、生後12か月から15か月まで】	『接種開始が生後2か月から7か月末満』 3回 (生後12か月までに27日以上の間隔で3回接種) 『接種開始が生後7か月から12か月末満』 2回 (生後12か月までに27日以上の間隔で2回接種)
	追加		『接種開始が生後2か月から7か月末満』 1回 (3回目の接種から60日以上の間隔をおいて、生後12か月以降に1回接種) 『接種開始が生後7か月から12か月末満』 1回 (2回目の接種から60日以上の間隔をおいて、生後12か月以降に1回接種)
			『接種開始が1歳から2歳未満』 2回 (60日以上の間隔で2回接種)
			『接種開始が2歳から5歳未満』 1回
B型肝炎	1歳未満	【生後2か月から生後9か月末満】	3回 (27日以上の間隔で2回目、初回から13日以上の間隔で3回目)
ロタウイルス	1価 (ロタリックス)	生後6週0日から24週0日未満 【生後2か月から14週6日までに初回接種】	2回 (27日以上の間隔で2回接種)
	5価 (ロタテック)	生後6週0日から32週0日未満 【生後2か月から14週6日までに初回接種】	3回 (27日以上の間隔で3回接種)
四種混合 (ジフテリア・百日せき・ 破傷風・ポリオ)	1期 初回	生後2か月から90か月末満 【生後2か月から12か月】	3回 (20日以上56日までの間隔で3回接種)
	1期 追加	生後2か月から90か月末満 【1期初回接種終了後、12か月から18か月】	1回 (1期初回接種終了後、6か月以上の間隔で1回接種)
二種混合 (ジフテリア・破傷風)	2期	11歳から13歳未満 【11歳から12歳】	1回
BCG	生後12か月未満	【生後5か月から生後8か月まで】	1回
麻しん・風しん (MR)	1期	生後12か月から24か月未満	1回
	2期	小学校就学前の1年間	1回
水痘	生後12か月から36か月末満 【1回目は、生後12か月から15か月の間】 【2回目は、初回接種終了後、6か月から12か月の間】		2回 (3か月以上の間隔で2回接種)
日本脳炎	1期 初回	生後6か月から90か月未満 【3歳から4歳未満】	2回 (6日以上28日までの間隔で2回接種)
	1期 追加	生後6か月から90か月未満 【4歳から5歳未満】	1回 (初回接種終了後、6か月以上の間隔で1回接種 ※おおむね1年を経過した時期)
	2期	9歳以上13歳未満 【9歳から10歳未満】	1回
ヒトパピローマ ウイルス (HPV)	2価 (サーバリックス)	小学6年生～高校1年生相当の女子 【13歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間】	3回 (1か月後に2回目、1回目から6か月後に3回目接種)
	4価 (ガーダシル)		3回 (2か月後に2回目、1回目から6か月後に3回目接種)
	9価 (シルガード)		『15歳になるまでに1回目を接種』 2回 (6か月後に2回目接種) 『15歳になってから1回目を接種』 3回 (2か月後に2回目、1回目から6か月後に3回目接種)
※平成9年4月2日～平成19年4月1日生まれの女子（積極的な接種勧奨の差し控えにより接種機会を逃した方）については、令和4年4月1日～令和7年3月31日まで接種の対象。			